

dr n. wet. Łukasz Adaszek

Kaszel psiarniowy (kenelowi)

Informacje ogólne.

Czynniki etiologiczne

- Wirus parainfluenzy typ 2 (PI-2)
- adenowirus psów typ 2 (CAV-2)
- herpeswirus typ 1
- *Bordetella bronchiseptica*
- paciorkowce
- gronkowce
- pasterele
- mykoplazmy
- Klebsiella spp. i in.
- Każdy z tych zarazków może spowodować ciężkie, długotrwałe choroby lub nawroty, nawet zagrażające życiu

Zakażenie

- Cały świat, choroba bardzo zaraźliwa
- W Polsce 30% psów ma Ig przeciwko PI-2 i CAV-2, a szczenięta do 50%.
- Bordetella też jest bardzo rozpowszechniona
- Zakażenie: kontakt bezpośredni
- Rola zagęszczenia (schroniska, hotele)
- Epidemie-kaszel nagły u wielu psów
- Zachorowalność 10-50%

Objawy kliniczne.

- Nagły początek, duża zaraźliwość.
- Suchy, gwałtowny, napadowy kaszel
- Krztuszenie się, aż do odruchów wymiotnych
- Powiększenie migdałków
- Często wypływ surowiczo-śluzowy z nosa i worka spojówkowego
- Stan ogólny dobry zwykle bez gorączki
- Po 7-14 dniach mija

Rozpoznawanie.

- Wywiad
- objawy
- różnicowanie: nosówka, apadnięcie pierścieni tchawicy, przewlekła niewydolność krążenia

Postępowanie.

- Spokój, ciepłe pomieszczenie, izolacja od innych psów
- Leki wykrztuśne: bromoheksyna 1 mg/kg co 12 h (Eres Flegamina), nawodnienie
- Przeciwkaszłowe
- rozszerzające oskrzela (teofilina 20 mg/kg co 12 h)
- Ewentualnie osłona antybiotykowa.

Zapobieganie

- szczepienia